Anexo 3

Encuesta del estudio

IE	dad.	
1	15-19 años.	
2	20-24 años.	
3	25-29 años.	
4	30-34 años.	
5	_ 35 y más años.	
II I	Nivel educacional.	
1	Primaria terminada.	
2	Secundaria terminada.	
3	_ Preuniversitario terminado.	
4	Técnico medio.	
5	Universitario.	
6	Iletrado.	
III	Ocupación.	
1	Estudiante.	
2	Trabajador asalariado.	
3	Trabajador por cuenta propia.	
4	Desocupado.	
IV	Estado civil.	
1	Soltero.	
2	Casado.	
3	Divorciado.	
	Viudo. <i>dwave</i> 2013 Ene/Feb;13(1):e5620	doi: 10.5867/medwave.2013.01.5620

V Ingreso familiar percápita.		
1 Entre \$200 y \$400		
2 Entre \$100 y \$199		
3 Entre \$50 y \$99		
4 Menos de \$50.		
VI Número de personas que conviven con el encuestado.		
1 Ninguna		
2 Una		
3 Dos		
4 Tres		
5 Cuatro o más.		
VII Reconocimiento por parte del paciente de su condición de alcohólico.		
1Sí.		
2 No.		
3 No procede.		
VIII Edad al inicio de ingestión de alcohol del paciente enfermo.		
1 < 15 años.		
2 15-19 años.		
3 20-24 años.		
4 25-29 años.		
5 30-34 años.		
6 35 y más.		
7 No procede.		

doi: 10.5867/medwave.2013.01.5620

IX F	Presencia de bebedores entre los convivientes del encuestado.
1	Padre.
2	Madre.
3	Hermanos.
4	Abuelos.
5	Tíos.
6	Primos.
7	No procede.
X E	stados emocionales que caracterizan al encuestado.
1	Ansiedad.
2	Depresión.
3	Estable.
	uncionamiento familiar del encuestado. Familia Funcional.
	Familia moderadamente funcional.
	Familia disfuncional.
	Familia severamente disfuncional.
XII	Motivos para ingerir bebidas alcohólicas.
1	Imitación.
2	Me gusta.
3	Tradición familiar.
4	Olvidar problemas.
5	Dependencia.
6	Por invitación.
7	No procede.

doi: 10.5867/medwave.2013.01.5620

XIII	Dificultades personales del encuestado, confrontadas durante el año previo al		
diagnóstico del alcoholismo.			
1	Divorcio.		
2	Maltratos a familiares.		
3	Abandono del hogar.		
4	Accidentes.		
5	Problemas laborales.		
6	Disfunciones sexuales.		
7	Intento suicida.		
8	Malas relaciones con amistades.		
9	No procede.		
XIV	Problemas judiciales del encuestado, confrontados durante el año previo al		
diagnóstico del alcoholismo.			
1	Riñas.		
2	Hurto.		
3	Estafa.		
4	Consumo de otras sustancias adictivas.		
5	Homicidio.		
6	Otros.		
7	No procede.		

doi: 10.5867/medwave.2013.01.5620